




Conseils à suivre lors du traitement


 Les gélules ou comprimés sont à prendre **au cours ou en dehors des repas, sans oubli, de préférence à la même heure, en respectant la dose prescrite par le médecin. Conservez le traitement à température ambiante, à l'abri de l'humidité.**

 **En cas d'oubli** d'une dose datant de **moins de 6 h** par rapport à l'heure de prise habituelle, prenez immédiatement le comprimé/gélule oublié(e) et poursuivez le traitement aux heures habituelles.


Si l'oubli date de plus de 6 h par rapport à l'heure de prise habituelle, ne pas doubler la dose, continuer le traitement aux heures et posologies habituelles.

 **Signalez que vous prenez un traitement par Pradaxa®, Xarelto® ou Eliquis® à tout professionnel de santé** (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme...). Si vous disposez d'une carte patient signalant la prise d'anticoagulants oraux, gardez-la sur vous.



 **Demandez l'avis de votre médecin avant toute prise d'un nouveau médicament, injection, extraction dentaire, soins de pédicurie, petite chirurgie, projet de voyage. Ne prenez jamais un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.**

 **Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin.** Ne prenez jamais l'initiative seul.

 **Redoublez de vigilance** concernant les sports, travaux ou autres activités pouvant entraîner des coupures ou des chutes.

 **En cas de vertiges, ne pas conduire de véhicule ou utiliser de machines.**

 **Ne laissez pas les comprimés à la portée des enfants.**

 **Ne jetez pas les emballages ni les comprimés dans votre poubelle.** Rapportez-les à votre pharmacien.

 **Si vous présentez un saignement, contactez rapidement votre médecin ou appelez le 15.**

FICHE N° 2 Anticoagulant oral

Pour PREVISCAN® SINTROM®
MINI-SINTROM® et COUMADINE®,
se référer à la fiche n° 1.

Votre médecin vous a prescrit un anticoagulant oral

Parmi lesquels on trouve
PRADAXA® Dabigatran Etxilate
XARELTO® Rivaroxaban
ELIQUIS® Apixaban



Qu'est-ce qu'un anticoagulant oral ?

Les **anticoagulants oraux** sont des médicaments sous forme de comprimés ou de gélules. Ils ont pour but de « fluidifier » le sang, autrement dit de ralentir la coagulation donc la formation de caillots.

Pourquoi prendre un anticoagulant oral ?

- **Prévention** de l'**accident vasculaire cérébral** et de l'**embolie systémique** chez les patients adultes avec fibrillation auriculaire non valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs de risque.
- **Prévention** des **événements thrombo-emboliques veineux** chez les patients adultes ayant bénéficié d'une chirurgie programmée pour prothèse totale de hanche ou prothèse totale de genou.
- **Traitement de la thrombose veineuse profonde** (TVP) et des **embolies pulmonaires** (EP), et **prévention des récives** sous forme de TVP et d'EP chez l'adulte.

Posologie

Attention les posologies ne sont pas les mêmes en fonction de l'indication pour laquelle ce médicament vous a été prescrit.



Le respect des posologies et du moment des prises lors du traitement anticoagulant par Pradaxa®, Xarelto® ou Eliquis® relève d'une importance vitale.

Il est donc essentiel de respecter la dose journalière indiquée sur l'ordonnance par votre médecin.

Liste des médicaments ayant une influence sur l'efficacité du traitement

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.



N'oubliez pas de donner la **liste complète de vos médicaments à votre médecin**, même ceux vendus sans ordonnance, ainsi que ceux à base de plantes.

Ne pas prendre de nouveau médicament sans l'accord de votre médecin ou votre pharmacien.

Principaux effets indésirables et suivi du traitement

Le principal effet, rare et parfois grave, résulte de son mécanisme d'action. Une fluidification trop importante du sang conduit au **risque de saignement = risque hémorragique**. Il faut donc être très vigilant pendant toute la durée du traitement, et contacter rapidement votre médecin dans les situations suivantes, pouvant faire évoquer un signe de surdosage :

- **Apparition de signes pouvant faire évoquer un saignement interne, non visible**
 - Pâleur
 - Fatigue ou essoufflement inhabituels
 - Maux de tête persistants
 - Malaise inexplicable
- **Apparition d'un saignement même mineur**
 - Saignement de nez ou des gencives
 - Hématomes
 - Présence de sang dans les urines
 - Présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes
 - Vomissements ou crachats sanglants
 - Saignements qui ne s'arrêtent pas (toutefois sous anticoagulants une plaie superficielle peut saigner plus longtemps)

Xarelto® et Eliquis® induisent fréquemment des vertiges, des nausées et peuvent donner de la fièvre.

Prévenez votre médecin en cas de démangeaisons, d'urticaire pendant votre traitement.

Grossesse et allaitement

Il est important d'**informer votre médecin** si vous découvrez que vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

L'utilisation d'un anticoagulant oral est fortement déconseillée voire contre-indiquée pendant la grossesse.



Il existe d'autres types de traitement anticoagulant, que votre médecin pourra alors vous prescrire.



L'allaitement est contre-indiqué durant le traitement.